

25 LAMPIDES BOETICUS

Blaaveta dels pèsols Long-tailed Blue

Dimensions Dimensions Größe Abmessungen 22-34 MM

Vulnerabilitat Vulnerabilidad Conservation status Anfälligkeit LC (IUCN)

Hàbitat / Habitat Garrigues, prats, conreus Motoroles, prados, cultivos Bushes, meadows, crops Dickeiche, Wiesen, Aboulfächer

Cicle biològic / Ciclo biológico Biological cycle / Lebenszyklus Polivoltí, de febrer a novembre Polivoltín, de febrer a novembre Multivoltine from February to November Polivotin, von Februar bis November

Descripció anàtoma / Descripción anatómica Anatomical description / Anatomische Beschreibung Dimorfisme sexual. Anvers amb tonalitats blauces en els masecs i negres en els fons. Les anteriors amb taques grogues amb una cuja. El revers presenta línies desdoblades, marrià clàr i blanquen amb dos cercles negres. Polimorfic per ser de color crema, rosada o verda.

Diferències sexuals. Anvers amb tonalitats blauces en els masecs i negres en els fons. Les posteriors amb taques grogues amb una cuja. El revers presenta línies desdoblades, marrià clàr i blancs amb dos cercles negres. Polimorfic: pot ser de color crema, rosada o verda.

Sexual dimorfism. Uperside has bluish tones in males and brownish in females. Anterior wings have orange-yellow patches with a tail. Underside has uneven light brown and white lines with two black eyespots. Polymorphic: can be cream, pink or green.

Geschlechtlicher Dimorphismus. Vorderseite mit bläulichen Tönen bei den Männchen und braun bei den Weibchen. Die hinteren Flügel haben orangefarbene Flecken mit einer Klappe und ungleiche Linien in Hellbraun und Weiß mit zwei schwarzen Ocellen auf. Polymorph: Er kann cremefarben, rosafarben oder grün sein.

Identificació / Identificación / Identification / Identifizierung Sembant a *L. pirithous*, però una mica més gran i amb una vistosa franja blanca postdiscal al revers de les ales.

Parecida a *L. pirithous*, però un poco más grande y con una vistosa franja blanca postdiscal en el reverso de las alas.

Similar to *L. pirithous* but slightly larger with a noticeable white postdiscal streak on the underside of the wings.

Ahnlichkeit mit *L. pirithous*, aber etwas größer und mit einem auffallenden weißen Streifen auf der Rückseite der Flügel.

26 LEPTOTES PIRITHOUS

Blaaveta del romani Lang Short-tailed Blue

Dimensions Dimensions Größe Abmessungen 21-30 MM

Vulnerabilitat Vulnerabilidad Conservation status Anfälligkeit LC (IUCN)

Hàbitat / Habitat Garrigues, conreus Motoroles, cultivos Bushes, crops Dickeiche, Aboulfächer

Cicle biològic / Ciclo biológico Biological cycle / Lebenszyklus Polivoltí, de febrer a novembre Polivoltín, de febrer a novembre Multivoltine from February to November Polivotin, von Februar bis November

Descripció anàtoma / Descripción anatómica Anatomical description / Anatomische Beschreibung Dimorfisme sexual. Anvers illes en masecs i marróns per les femelles. Revers amb taques desiguals, gris foscor, aclarat i les posteriors amb taques negres.

Diferències sexuals. Langs illets en les macheas y amurando en les hembras. Revers amb manches desiguals, gris oscuro y clar; en les posteriores dos cercles negros y una cuja en cada una.

Sexual dimorfism. Like upperside in males and brownish in females. Reverse with dark and light grey uneven markings. There are two black spots on the hind wings and a tail on each wing.

Geschlechtlicher Dimorphismus. Vorderseite in violetten Tönen bei den Männchen und braunlich bei den Weibchen. Rückseite mit unregelmäßigen Flecken daneben und hell an den Hinterflüglern mit zwei schwarzen Ocellen und einem Schwanz an jedem Flügel.

Identificació / Identificación / Identification / Identifizierung Similar a *L. leptothes*, però generalment més petita i sense la franja blanca postdiscal al revers de les ales.

Parecida a *L. leptothes*, pero generalmente más pequeña que la franja blanca postdiscal en el reverso de los alas.

Similar to *L. leptothes*, but generally smaller and without the white postdiscal streak on the underside of their wings.

Ahnlichkeit mit *L. leptothes*, aber allgemein etwas kleiner und ohne den hinteren weißen Streifen auf der Rückseite der Flügel.

27 POLYOMMATUS BELLARGUS

Blaaveta o blaaveta de la ginesta Chagrin's Blue

Dimensions Dimensions Größe Abmessungen 25-32 MM

Vulnerabilitat Vulnerabilidad Conservation status Anfälligkeit LC (IUCN)

Hàbitat / Habitat Garrigues, prats, conreus Motoroles, prados, cultivos Bushes, meadows, crops Dickeiche, Wiesen, Aboulfächer

Cicle biològic / Ciclo biológico Biological cycle / Lebenszyklus Bivoltí, de maig a setembre Bivoltín, de mayo a septiembre Bivoltina from May to September Bivoltin, von Mai bis September

Descripció anàtoma / Descripción anatómica Anatomical description / Anatomische Beschreibung Dimorfisme sexual. Els males tenen l'avers blau cel amb reflexos metàl·lics; les femelles teneixen l'avers marró amb una línia de taques ataronjades a l'estrem d'amboles ales. El revers es marra grisós en males i marró en femelles.

Diferències sexuals. Los machos tienen el avers azul cielo con reflejos metálicos; los hembras tienen el avers marrón con una línea de manchas anaranjadas en el extremo de ambas alas. El reverso es marrón grisáceo en machos y marrón en hembras. En ambos casos, linea de manchas naranjas bordeadas de blanco situadas en el extremo de ambas alas. Bordeadas de blanco distribuidas de forma desigual por ambos alas. Fimbrias roydas.

Sexual dimorphism. Male have a light blue upperside with metallic hints. The females have a brown underside with a line of orange-red spots at the tip of both wings. The underside is greyish brown in males and brownier in females. In both cases, there is a line of orange markings edged in black near the margin and black bordered by white distributed unevenly along the veins. Striped borders.

Geschlechtlicher Dimorphismus. Die Vorderseite bei den Männchen ist himmelblau mit metallischen Reflexen. Bei den Weibchen ist die Vorderseite braun mit einer Reihe orangefarbener Flecken am Ende beider Flügel. Die Rückseite ist bei den Männchen graubraun und bei den Weibchen eher braun. Beide weisen eine Linie aus orangefärbigen, schwarz umrandeten Flecken in der Nähe des Randaus sowie schwarze Punkte mit weißem Umranden auf, die unregelmäßig über beide Flügel verteilt sind. Gestreifte Fimbrien.

Identificació / Identificación / Identification / Identifizierung Sembant a *P. celina*, però amb les fimbries roydas.

Parecida a *P. celina*, pero con las fimbrias roydas.

Similar to *P. celina*, but with striped borders.

Ahnlichkeit mit *P. celina*, jedoch mit gestreiften Fimbrien.

28 POLYOMMATUS CELINA

Blaaveta africana Escher's Blue

Dimensions Dimensions Größe Abmessungen 22-36 MM

Vulnerabilitat Vulnerabilidad Conservation status Anfälligkeit LC (IUCN)

Hàbitat / Habitat Garrigues, prats, conreus Motoroles, prados, cultivos Bushes, meadows, crops Dickeiche, Wiesen, Aboulfächer

Cicle biològic / Ciclo biológico Biological cycle / Lebenszyklus Trivoltí, de març a juliol Trivoltín, de marzo a julio Trivoltino from March to July Trivoltino from März bis Juli

Descripció anàtoma / Descripción anatómica Anatomical description / Anatomische Beschreibung Dimorfisme sexual. Anvers blau brillant amb una estreta faixa fosca als marge; les femelles són marrones. El revers és gris palid, casi blanc. Les anteriors amb taques de color negre; les posteriors amb més taques negres, més petites. En ambdos casos, una línia de taques ataronjades vorajades de negre prop del marge.

Diferències sexuals. Anvers ocellat i brillant amb una estreta faixa fosca als marge; les femelles són marrones. El revers es gris palid, casi blanc. Les anteriors con manchas de color negro; posteriores con más manchas negras, más pequeñas. En ambos casos, una línea de manchas naranjas bordeadas de negro cerca del margen.

Sexual dimorphism. Bright blue upperside with a narrow dark band on the margins. In both cases, a line of orange markings with black borders near the margin.

Geschlechtlicher Dimorphismus. Hellblaue Vorderseite mit einem schmalen dunklen Streifen an den Rändern. Die Webchen sind brüllend. Die Rückseite ist hellgrau, fast weiß. Die Vorderseite weisen schwarze Flecken auf; die Hinterflügel haben mehr und kleinere orangefarbene Flecken. In beiden Fällen gibt es eine Linie aus orangefärbigen, schwarz umrandeten Flecken in der Nähe des Randes.

Identificació / Identificación / Identification / Identifizierung Sembant a *P. bellargus*, els punts són més petits, sense ruffles en les fimbries.

Parecida a *P. bellargus*; los puntos son más pequeños, sin ruffles en los fimbrios.

Similar to *P. bellargus*; the dots are smaller and there are no stripes on the borders.

Ahnlichkeit mit *P. bellargus*, die Punkte sind kleiner und weisen keine Streifen an den Fimbrien auf.

